



SIMBOLO	DESCRIPCION	Area (ha)
FAMRBNPN	Terreno con aptitud moderada para especies forestales por erosión severa, para especies de clima medio y cálido, por erosión. Y en aguas para frutales de pastoreo.	93206
FAMCRNPN	Terreno con aptitud moderada por erosión severa, para especies de clima medio y cálido, por erosión, pero no presenta limitación de productividad agrícola. Y en aguas para frutales de pastoreo.	129966
FACIRAZDPA	Aptitud óptima para especies de clima cálido como: Aguacatillo, Cedro, Cuajunche de Moratilla, Cacha, Cachaño, Hoyo, Jijoa Negro, Medio Cansino, Nandi, Saco, Trébollo Borracho, Guayacán Amarillo, Cacha Fresa, Guadalupe, Marañón, Papandú, Simito, Tamandú. Viento y demás especies nativas de clima cálido. Y áreas con aptitud moderada por déficit de agua para frutales arbóreas como mango, aguacate, chontaduro, lino, guanábana y guayaba; arbustivas y pasturas como Maricao y j. pilla. Y tierras con aptitud óptima.	52764
FACIRAZDPA2	Aptitud óptima para especies de clima cálido como: Aguacatillo, Cedro, Cuajunche de Moratilla, Cacha, Cachaño, Hoyo, Jijoa Negro, Medio Cansino, Nandi, Saco, Trébollo Borracho, Guayacán Amarillo, Cacha Fresa, Guadalupe, Marañón, Papandú, Simito, Tamandú. Viento y demás especies nativas de clima cálido. Y áreas con aptitud moderada por déficit de agua para frutales arbóreas como mango, aguacate, chontaduro, lino, guanábana y guayaba; arbustivas y pasturas como Maricao y j. pilla. Y tierras con aptitud óptima.	3485
FACIRAZDPA3	Terreno con aptitud moderada para especies de clima cálido como: Aguacatillo, Cedro, Cuajunche de Moratilla, Cacha, Cachaño, Hoyo, Jijoa Negro, Medio Cansino, Nandi, Saco, Trébollo Borracho, Guayacán Amarillo, Cacha Fresa, Guadalupe, Marañón, Papandú, Simito, Tamandú. Viento y demás especies nativas de clima cálido. Y áreas con aptitud moderada por déficit de agua para frutales arbóreas como mango, aguacate, chontaduro, lino, guanábana y guayaba; arbustivas y pasturas como Maricao y j. pilla. Y tierras con aptitud óptima.	31404
FACIRNPA1	Aptitud óptima para especies de clima cálido como: Aguacatillo, Cedro, Cuajunche de Moratilla, Cacha, Cachaño, Hoyo, Jijoa Negro, Medio Cansino, Nandi, Saco, Trébollo Borracho, Guayacán Amarillo, Cacha Fresa, Guadalupe, Marañón, Papandú, Simito, Tamandú. Viento y demás especies nativas de clima cálido. Y áreas sin aptitud para frutales arbóreas. Y tierras con aptitud óptima para pasturas.	914
FACIRNPN	Aptitud óptima para especies de clima cálido como: Aguacatillo, Cedro, Cuajunche de Moratilla, Cacha, Cachaño, Hoyo, Jijoa Negro, Medio Cansino, Nandi, Saco, Trébollo Borracho, Guayacán Amarillo, Cacha Fresa, Guadalupe, Marañón, Papandú, Simito, Tamandú. Viento y demás especies nativas de clima cálido. Y áreas sin aptitud para frutales de pastoreo.	1734
FACIRNPN2	Terreno con aptitud óptima para especies de clima frío como: Añón, Aguacatillo, Carrizo, Cuadrito, Cedro, Cacho, Chilo Colorado, Focavillo, Manduro, Maza, Pino Colorado, Roble, Siete Capas, Encino, una especie nativa del mismo clima. Y áreas sin pastoreo.	64584
FAMIRAZDPA	Aptitud óptima para especies propias del clima medio como: Arroz de Guayabo, Bolo Blanco, Cacahútilo, Cacha Brea, Guayacán, Jijoa, Laurel de Caro, Moratillo Amarillo, Palmeto, Páramo, Páramo, Palmeto, Bolo Blanco, Yareño, Jijoa, Scudalón, Cacha, Chirimolito, Guano, Manzano, Saco Playón, Solitario, Tarhuán, Pindo y todas las especies nativas de clima frío. Y áreas con aptitud moderada por pendientes mayor a 12, 25 y 50%, más erosión moderada para frutales arbóreas como mango, aguacate, chontaduro y guayaba. Y tierras sin aptitud para pastoreo.	7320
PNRACZPA2D	Terreno sin aptitud forestal y aptitud moderada por pendientes mayor a 12, 25 y 50%, más erosión moderada para frutales arbóreas como mango, aguacate, chontaduro, lino, guanábana y guayaba. Y tierras sin aptitud para pastoreo.	10062
PNRACZPN	Terreno sin aptitud forestal y aptitud moderada por pendientes mayor a 12, 25 y 50%, más erosión moderada para frutales arbóreas como mango, aguacate, chontaduro, lino, guanábana y guayaba. Y tierras sin aptitud para pastoreo.	3961
PNRNP2D	Terreno sin aptitud forestal ni para frutales por pendientes mayor a 50%, más erosión severa. Y tierras sin aptitud moderada por disponibilidad de agua. En algunos muestreos donde la erosión es severa, este uso se puede realizar en pendientes menores del 25%.	35463
PNRNP	Terreno sin aptitud forestal ni para frutales ni para pastoreo por pendientes mayor a 50%, más erosión severa.	298356

CORPORACION COLOMBIANA DE INVESTIGACION AGROPECUARIA
 Plan Estratégico Sostenible de Ecosistemas Regionales

ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL ALTO PATIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
 DEPARTAMENTO DE CAUCA
MUNICIPIO DE PATIA
APTITUD DE USO DE LA TIERRA PARA FORESTAL, FRUTALES Y PASTOREO
 ESQUEMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL
 Fuente: Fotografía: Corporación Colombiana S.A. y Requerimientos para cultivos del ICA, FAO y CONIF

Escala: 1:50000

CONVENCIONES
 • Corregimientos
 - Limite municipal
 - Río Patía
 - Quebradas
 - Curvas de nivel

MAPA No.
 Edición: CORPOICA Bogotá D. C., Diciembre de 2002